



Traditional Chinese - Number 08b STI Series - February 2019

尿道炎 Urethritis

甚麼是尿道炎?

尿道炎即尿道炎症。尿道是將尿液從膀胱輸出體 外的管道。男性陰莖同時也輸送精液。

導致尿道炎的原因是什麼?

尿道炎通常由性傳播感染(STI)引起,如淋病、衣原體病菌或單純皰疹病毒。此類病例在性活躍的年輕男性中更為多見。尿道炎也可以由非性傳播的其他微生物引起,例如,在生殖器部位生長的普通細菌就可以使尿道受到感染。有時,膀胱或前列腺感染,或者是近期所做的尿道相關手術也會導致尿道炎。如需瞭解更多有關淋病和衣原體病菌的資訊,請參閱 HealthLinkBC File #08a 淋病 和 HealthLinkBC File #081 衣原體疾病。

要確認是否患上了尿道炎,應該由醫務人員檢查並進行化驗。

如果兒童出現不明原因或反复發生的症狀,必須 考慮其是否受到性虐待。

該疾病如何傳播?

引起尿道炎的性傳播微生物是通過無保護的口交、 陰道或肛門性交傳播的。

有哪些症狀?

尿道炎的症狀包括:

- 陰莖或陰道排出透明或粘膜狀分泌物
- 陰莖前端可能出現紅腫
- 排尿時有疼痛或灼燒感
- 尿道(排尿的管道)瘙癢或疼痛

除上述常見症狀外,成人或兒童也可能會出現:

- 腹痛
- 無尿意

• 小便失禁

尿道炎患者也可能完全沒有症狀。

可能出現哪些併發症?

如果未能針對引起尿道炎的細菌進行治療,患者 可能會出現單側或兩側睾丸疼痛和腫脹,甚至有 可能不育。

有何治療方法?

因細菌導致的尿道炎可以通過服用抗菌素治療。 為保證治療效果,請認真遵守醫囑,並服完所有 醫生開具的藥物。如果感染是通過性行為傳播的, 性伴侶也應接受檢查和治療。感染需在一段時間 後才能從體內完全清除,所以在您和您的性伴侶 開始抗生素治療後的7天內,請不要進行任何口 交、陰道性交或肛交,這一點非常重要。

如果您和您的性伴侶未能完成全部治療,漏服藥物,或在完成全部治療前發生了無保護性行為, 感染可能依然會留在體內,並重新傳染給您的性伴侶,亦有可能造成後續健康問題。如果發生了這種情況,請諮詢您的醫護人員,他們會幫助確定您或您的性伴侶是否需要進一步的治療。如果發現了其他病因,醫護人員可能會給予您其他方式的治療。

我如何才能降低患性傳播感染(STI)的可能性?

使用安全套,安全性交

正確使用外用式(男用)和內用式(女用)安全 套有助於在陰道、口交和肛門性交時預防許多性 傳播感染。對於預防像單純皰疹病毒、生殖器疣 (人乳頭狀瘤病毒/HPV)和梅毒(已經出現潰 瘡)之類通過皮膚接觸傳播的性傳播感染,安全 套並不是特別有效。 使用安全套時請牢記以下要點:

- 檢查安全套的包裝是否完好,不要使用破損的 安全套
- 檢查安全套的保質期,不要使用過期的安全套
- 小心拆開包裝,以免撕裂安全套;不要使用被撕壞的安全套
- 不要將安全套與尖銳物品(例如戒指、釘扣或 穿孔物)放在一起
- 安全套要在室溫下存放
- 每次性交都要使用新的安全套,不要重複使用 安全套
- 不要一次使用2隻安全套,套疊使用易使安全 套破損
- 若使用外用式(男用)乳膠安全套,請只選擇 水性潤滑劑,像凡士林、乳液、嬰兒油這樣的 油性潤滑劑會使乳膠變薄甚至破損
- 如使用聚氨酯或丁腈(polyurethane/nitrile)材質的安全套,則水性或油性潤滑劑均可
- 僅使用由乳膠或聚氨酯/丁腈/聚異戊二烯橡膠 製成的安全套,乳膠和聚氨酯材料製成的安全 套,避孕和預防性傳播感染的效果最佳(山羊 皮和綿羊皮製成的安全套可以幫助避孕,但在 預防性傳播感染方面的效用不如乳膠或聚氨酯 安全套)
- 避免使用含有 nonoxynol-9 (N-9)的安全套,此 類產品會刺激身體組織,並增加患 STI 的風險

接種疫苗

接種疫苗可預防部分性傳播感染,如甲肝、乙肝和人乳頭狀瘤病毒(HPV)感染。請向您的醫護人員諮詢接種相關事官。

瞭解自己的性健康狀況

如果您最近換了性伴侶,或有多個性伴侶,應定 期接受性傳播感染檢測,以確定是否感染。有些 STI 感染者並無症狀。查明並治療性傳播感染, 能夠降低將疾病傳染給性伴侶的概率。

性伴侶數量越多,接觸到性傳播感染的可能性就越大。

探討預防措施

發生性行為前,請與您的性伴侶探討性傳播感染 和您希望採取的預防措施。如果您感到與性伴侶 探討安全性行為有困難,請諮詢您的醫護人員或 諮詢師。

如需瞭解與性伴侶探討的技巧,請訪問卑詩省疾病控制中心(BCCDC)的「安全性行為資源」 (Smart Sex Resource)網頁: https://smartsexresource.com/sex-talk/talk-about-it。

告知您的性伴侶

如果您感染了性傳播疾病且處於性活躍期,請務 必告知您的性伴侶。這樣,他們才能就自己的健 康和是否接受測試做出決定。

更多資訊

如需瞭解有關如何降低罹患 STI 機率的更多資訊,請參閱 <u>HealthLinkBC File #08o 預防性傳播感染</u> (STIs)。

